



28 فيفري 2023

## منشور ع.....د

- الموضوع :** تحيين الرزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الأولى من العمر.
- المرجع :** قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة التلقيح الإلزامية.
- المصاحب :** الرزنامة الوطنية للتلقيح المحينة باللغتين الفرنسية والعربية.

في إطار تعزيز حصانة الأطفال ودعم مكسب إستئصال شلل الأطفال من بلادنا، وبناء على توصيات اللجنة الإستشارية للتلقيح في إجتماعها يوم 6 ديسمبر 2022 حول زيادة جرعة ثالثة من اللقاح المعطل لشلل الأطفال vaccin polio injectable في الرزنامة الوطنية للتلقيح والتخلي عن الجرعة الثالثة من اللقاح الفموي، وذلك في نطاق الإستبدال التدريجي للقاح الشلل الحي الفموي بلقاح الشلل المعطل المسند في شكل حقنة حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، فقد تقرر تحيين هذه الرزنامة لتصبح كما يلي في ما يخص التلقيح التي تقدم للطفل خلال السنة الأولى من العمر :

### • عند الولادة :

1. لقاح إلتهاب الكبد الفيروسي "ب"
2. لقاح الـ ب.س.ج (ضد السل)

### • في الشهر الثاني من العمر :

1. الجرعة الأولى من اللقاح الخماسي
2. الجرعة الأولى من اللقاح المعطل لشلل الأطفال
3. الجرعة الأولى من لقاح المكورات الرئوية

### • في الشهر الثالث من العمر :

1. الجرعة الثانية من اللقاح الخماسي
2. الجرعة الثانية من اللقاح المعطل لشلل الأطفال


• في الشهر السابع من العمر:  
1. الجرعة الثانية من لقاح المكورات الرئوية

• في الشهر السادس من العمر:  
1. الجرعة الثالثة من اللقاح الخماسي  
2. الجرعة الثالثة من اللقاح المعطل لشلل الأطفال

• في الشهر الحادي عشر من العمر  
1. الجرعة الثالثة من لقاح المكورات الرئوية

هذا وإلى أعزول على حزمكم الممهودة لتأمين التوزيع الشامل لهذا المنشور لكل العاملين في القطاعين العمومي والخاص على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 01 مارس 2023.

الإمضاء  
وزير الصحة

  
وزير الصحة  
علي المرابط

المرسل إليهم المسادة والسيدات :

للإعلام {

- المديرين العاملين ومديري الإدارات المركزية
- الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية
- الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
- المدير العام لمعهد باستور بتونس
- رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء
- رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيدلانية
- الإدارة العامة للصحة العسكرية - وزارة الدفاع
- إدارة الصحة - وزارة الداخلية

للإعلام والتنفيذ والمتابعة {

- المديرين الجهويين للصحة
- كواهي مديري الرعاية الصحية الأساسية
- المديرين العاملين ومديري المستشفيات
- مديري المؤسسات الصحية الخاصة

للإعلام والتنفيذ {

- مراكز الصحة الأساسية
- مراكز رعاية صحة الأم والطفل



## Le calendrier vaccinal Mars 2023

AGE	VACCINS	OBSERVATIONS	
<b>VACCINATION DES FEMMES EN AGE DE PROCREATION</b>	Mise à jour de la vaccination antitétanique	dT1	Dès le premier contact avec la structure de santé
		dT2	1 mois après dT1
		dT3	1 an après dT2
		dT4	5 ans après dT3
		dT5	Tous les 10 ans après dT4
	Mère en post-partum immédiat	Vaccin de la rubéole	Pour les femmes non immunisées contre la rubéole
<b>VACCINATION DE L'ENFANT EN AGE PRESCOLAIRE</b>	A la naissance	BCG	- Vaccin contre la tuberculose : 1 seule dose le plus tôt possible après la naissance. Ne sont plus indiquées dans la suite de cette 1 <sup>ère</sup> injection ni la pratique de l'IDR à la tuberculine ni le rappel par le BCG
		HBV-0	- Vaccin contre l'hépatite B : cette prise est à administrer durant les 24 heures qui suivent la naissance quel que soit le résultat de la sérologie de l'hépatite B chez la mère
	A 2 mois	Pentavalent-1 + VPI + PCV1	- 1 <sup>ère</sup> injection de vaccin Pentavalent qui inclut le vaccin de l'hépatite B, le DTC (vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche) et le vaccin Hib (contre l'haemophilus type b) - 1 <sup>ère</sup> prise du vaccin contre la poliomyélite (injectable) - 1 <sup>ère</sup> prise du vaccin pneumococcique
	A 3 mois	Pentavalent-2 + VPI	- 2 <sup>ème</sup> prise du vaccin pentavalent - 2 <sup>ème</sup> prise du vaccin contre la poliomyélite (injectable)
	A 4 mois	PCV2	- 2 <sup>ème</sup> prise du vaccin pneumococcique
	A 6 mois	Pentavalent-3 + VPI	- 3 <sup>ème</sup> prise du vaccin pentavalent - 3 <sup>ème</sup> prise du vaccin contre la poliomyélite (injectable)
	A 11 mois	PCV3	3 <sup>ème</sup> prise du vaccin pneumococcique
	A 12 mois	RR-1 HVA	-1 <sup>ère</sup> prise du vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole -vaccin contre l'hépatite virale A
A 18 mois	DTC4 + VPO + RR-2	- Rappel par les vaccins DTC - Rappel par le vaccin contre la poliomyélite (oral) - Rappel par le vaccin contre la rougeole et la rubéole	
<b>VACCINATION DE L'ENFANT EN AGE SCOLAIRE</b>	A 6 ans (élèves en 1 <sup>ère</sup> année de l'école de base)	VPO + VHA	- Rappel par le vaccin oral contre la poliomyélite - Une prise du vaccin de l'hépatite virale A
	A 7 ans (élèves en 2 <sup>ème</sup> année de l'école de base)	dT	- Rappel par les vaccins contre la diphtérie et le tétanos
	A 12 ans (élèves en 6 <sup>ème</sup> année de l'école de base)	dT + VPO	- Rappel par les vaccins contre la diphtérie et le tétanos - Rappel par le vaccin oral contre la poliomyélite
	A 18 ans (élèves en 3 <sup>ème</sup> année secondaire)	dT + VPO	- Rappel par les vaccins contre la diphtérie et le tétanos - Rappel par le vaccin oral contre la poliomyélite





## البرنامج الوطني للتلقيح بالجمهورية التونسية مارس 2023

العمر	التلقيح	
الأم الحامل غير الملقحة	خلال أول عيادة للحمل	
	أربعة أسابيع على الأقل بعد الحقنة الأولى	
	سنة بعد الحقنة الثانية	
	خمس سنوات بعد الحقنة الثالثة	
	كل عشر سنوات بعد الحقنة الرابعة	
	بعد الولادة مباشرة	
الطفل في سن ما قبل الدراسة	عند الولادة خلال الـ 24 ساعة الأولى	
	في الشهر الثاني	
	في الشهر الثالث	
	في الشهر الرابع	
	في الشهر السادس	
	في الشهر الحادي عشر	
	في الشهر الثاني عشر	
	في الشهر الثامن عشر	
	الطفل في سن الدراسة	في سن السادسة من العمر
		في سن السابعة من العمر
في سن الثانية عشرة من العمر		
في سن الثامنة عشرة من العمر		
في سن الثامنة عشرة من العمر		